10 RAZONES

por las que muchos perros se merecen un antiparasitario de amplio espectro de administración mensual

CONTROL ANTIPARASITARIO
HAZLO BIEN
HAZLO MENSUAL
EXTERNOS E INTERNOS

Un control parasitario adecuado es esencial para proteger la salud de los animales, mejorar la salud pública y preservar el vínculo persona-animal[1].

Boehringer Ingelheim

10 RAZONES por las que muchos perros se merecen un antiparasitario de amplio espectro de administración mensual

1.

PROTEGE AL MISMO TIEMPO FRENTE A PARÁSITOS EXTERNOS E INTERNOS PREVALENTES, GRAVES Y ZOONÓSICOS, ADAPTÁNDOSE A LOS PROTOCOLOS DE CONTROL PARASITARIO RECOMENDADOS POR LOS EXPERTOS.

Asociaciones de parasitólogos como el CAPC[2] en EEUU recomiendan que a todas las mascotas se les aplique un control parasitario de amplio espectro durante todo el año con eficacia frente a parásitos externos, parásitos intestinales y dirofilariosis. El control de los parásitos zoonósicos es esencial.

2.

PROTEGE FRENTE A LOS **NEMATODOS INTESTINALES**, PARÁSITOS PREVALENTES Y ZOONÓSICOS, ADAPTÁNDOSE A LOS PROTOCOLOS NECESARIOS PARA LA MAYORÍA DE LOS PERROS.

Debido a los periodos de prepatencia, en Europa, el ESCCAP[3], recomienda la desparasitación interna mensual para perros con riesgo de infección por nematodos intestinales[a, b, c]:

- ✓ Cachorros[d]
- ✓ Perros que viven con niños y/o personas inmunocomprometidas
- ✓ Perros con libre acceso al exterior
- ✓ Perros con acceso a jardines
- ✓ Perros de perreras
- ✓ Perros profesionales

En un estudio reciente, donde se valora el riesgo de infección por parásitos internos en perros con propietario de España, el 96% de los perros fue asignado al grupo de alto riesgo donde el ESCCAP recomienda la desparasitación interna mensual[4].

CONTROL ANTIPARASITARIO – HAZLO BIEN HAZLO MENSUAL – EXTERNOS E INTERNOS

LA **DESPARASITACIÓN MENSUAL MINIMIZA LAS INFECCIONES PATENTES** Y LA CONSIGUIENTE CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE CON HUEVOS Y/O LARVAS. DE ESTA MANERA, SE **PROTEGE A LOS PERROS Y A LAS PERSONAS.**



3.

PREVIENE LA **THELAZIOSIS OCULAR,** ENFERMEDAD PREVALENTE, ZOONÓSICA Y EN EXPANSIÓN.

La única manera de prevenir la thelaziosis es mediante el uso mensual de antihelmínticos.

UNO PARA TODOS

[a] Según valoración riesgo de infección.
[b] Como alternativa se pueden hacer coprológicos mensuales, aunque siempre habrá que tomar los resultados negativos con precaución.
[c] Una frecuencia de desparasitación mínima de 4 veces al año es la recomendación general, aunque esta pauta no previene necesariamente las infecciones patentes.
[d] Ver posteriormente protocolo de desparasitación con detalle.

4.

PREVIENE LA **DIROFILARIOSIS**, ENFERMEDAD GRAVE, PREVALENTE Y EN EXPANSIÓN, **PROTEGIENDO ADEMÁS FRENTE A OTROS PARÁSITOS QUE SÓLO SE PUEDEN CONTROLAR MENSUALMENTE.**

Los expertos[3,5,6] recomiendan el uso de antihelmínticos preventivos durante todo el año. Además, los productos preventivos de amplio espectro permiten controlar al mismo tiempo otros parásitos patógenos y/o zoonósicos[4], como los gusanos intestinales, si es necesario[1].

5.

PREVIENE LA **ANGIOSTRONGILOSIS**, ENFERMEDAD GRAVE Y EN EXPANSIÓN.

Angiostrongylus vasorum es un parásito clave que dirige las pautas de desparasitación interna en perros de zonas endémicas[3]. La única manera de prevenir la angiostrongilosis es mediante el uso mensual de antihelmínticos.

6.

SE ADAPTA A LOS **PROTOCOLOS DE CONTROL PARASITARIO INDICADOS POR LOS EXPERTOS EN CACHORROS**, VULNERABLES A LAS PARASITOSIS.

Se recomienda la desparasitación interna frecuente en cachorros: desde las 2 semanas de vida hasta las 2 semanas postdestete cada 2 semanas y, posteriormente, mensual hasta los 6 meses de edad[3]. Se recomienda la prevención de enfermedades como la dirofilariosis cuanto antes, no más tarde de los 2 meses de edad[3,5,6].

7.

SE ADAPTA AL RÁPIDO CAMBIO DE PESO EN CACHORROS EN CRECIMIENTO.

Los cachorros pueden cambiar de peso rápidamente durante los primeros meses de vida. Un antiparasitario mensual permite escoger la presentación que se ajuste en cada momento al peso del cachorro.

8.

OFRECE UN **CONTROL CONSTANTE DE PARÁSITOS EXTERNOS MES A MES.**

Es importante que las moléculas ectoparasiticidas mantengan una duración constante y homogénea frente a todas las especies de pulgas y garrapatas que existen en la zona.

9.

ES GARANTÍA DE **PRACTICIDAD Y TRANQUILIDAD PARA PROPIETARIOS Y VETERINARIOS.**

Un solo gesto al mes sin necesidad de combinaciones confusas para cumplir con los protocolos de desparasitación indicados por los expertos.

10.

RESPONDE A LOS **DESEOS DE LOS PROPIETARIOS.**

El 77% de propietarios Españoles realizarían una pauta mensual en el caso de existir la necesidad de prevenir una enfermedad zoonósica y/o grave para el perro. Sin embargo, casi un 70% de los propietarios afirman que desconocen la necesidad de desparasitar mensualmente[7].

¡ATENCIÓN! Hacerlo bien está en tus manos, ayuda al propietario a ser consciente de los riesgos.

NUEVO ESTUDIO

NEXGARD SPECTRA®, EL ANTIPARASITARIO MÁS COMPLETO EN UN SABROSO COMPRIMIDO

EFICACIA

El antiparasitario oral de mayor espectro:

- Helmintos emergentes y zoonóticos.
- Ectoparásitos.
- Los tres nematodos gastrointestinales más comunes.

SEGURIDAD

Ofrece un buen perfil de seguridad en:

- Cachorros*; además las dosis mensuales se ajustan al rápido cambio de peso.
- Perros adultos de todo tipo de razas, incluyendo Collies.

PRACTICIDAD

PARA EL VETERINARIO:

- **Flexibilidad:** sólo 1 antiparasitario en la clínica para adaptarse a las recomendaciones de los expertos.
- **Comodidad:** presentado en un envase clínico de 15 comprimidos.

PARA EL PROPIETARIO:

- **Gran palatabilidad**: una experiencia positiva para propietario y perro que favorece el cumplimiento.
- **Comodidad:** un solo gesto protege frente a los parásitos externos e internos más comunes.

* A partir de 8 semanas de edad y de 2 kg de peso

NEXGARD SPECTRA®

Nexgard® Spectra comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido masticable contiene: afoxolaner 9,375 mg/milbemicina oxima 1,875 mg (para perros 2-3,5 Kg); afoxolaner 18,75 mg/milbemicina oxima 3,75 mg (para perros >3,5-7,5 Kg); afoxolaner 37,5 mg/milbemicina oxima 7,5 mg (para perros >7,5-15 Kg); afoxolaner 75 mg/milbemicina oxima 15 mg (para perros >15-30 Kg); afoxolaner 150 mg/milbemicina oxima 30 mg (para perros >30-60 Kg). **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas en perros cuando esté indicado a la vez la prevención de la dirofilariosis (larva *Dirofilaria immitis*), angiostrongilosis (reducción del nivel de adultos inmaduros (L5) y adultos de *Angiostrongylus vasorum*), thelaziosis (adultos de *Thelazia callipaeda*) y/o el tratamiento de infestaciones por nematodos gastrointestinales. Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) en perros durante 5 semanas. Tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*) en perros durante 4 semanas. Las pulgas y las garrapatas deben adherirse al hospedador y empezar a alimentarse a fin de quedar expuestas a la sustancia activa. Tratamiento de las infestaciones por nematodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: ascáridos (*Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*), anquilostomas (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* y *Ancylostoma ceylanicum*) y tricúridos (*Trichuris vulpis*). Tratamiento de demodicosis (causada por *Demodex canis*). Tratamiento de sarna sarcóptica (causada por *Sarcoptes scabiei* var. *canis*). Prevención de la dirofilariosis (larvas de *Dirofilaria immitis*) con administración mensual. Prevención de angiostrongilosis (por reducción del nivel de infección con etapas de adulto inmaduro (L5) y adulto de *Angiostrongylus vasorum*) con administración mensual. Prevención del establecimiento de thelaziosis (infección del gusano ocular adulto *Thelazia callipaeda*) con administración mensual. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Uso durante la gestación y la lactancia:** No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia o en perros en periodo de reproducción. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio-riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Reacciones adversas:** Reacciones adversas tales como: vómito, diarrea, letargia, anorexia y prurito, se observaron infrecuentemente. Estas reacciones fueron en general de resolución espontánea y de corta duración. Eritema y signos neurológicos (convulsiones, ataxia y temblores musculares) han sido reportados en muy raras ocasiones. **Posología:** Vía oral. A la dosis de 2,50–5,36 mg/kg de afoxolaner y 0,50-1,07 mg/kg de milbemicina oxima. Los comprimidos son masticables y apetitosos para la mayoría de perros. Si el perro no acepta los comprimidos directamente, pueden administrarse con la comida. La pauta del tratamiento debería basarse en el diagnóstico veterinario y en la situación epidemiológica local. **Precauciones:** En ausencia de datos disponibles, el tratamiento de cachorros de menos de 8 semanas de edad y de perros que pesen menos de 2 kg debe basarse en la evaluación beneficio-riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Conservación:** Conservar el blíster en la caja con objeto de protegerlo de la luz. **Nº autorización:** EU/2/14/177/002-005-008- 011-014-016-017-018-019-020. **Presentación:** 3 y 15 comprimidos en blísteres. **Titular:** Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

BIBLIOGRAFÍA

1. ESCCAP. How to protect pets from parasites. Fact Sheet ESCCAP. https://www.esccap.org/uploads/docs/t58tbu33_0687_ESCCAP_General_Recommendations_update_v5.pdf
2. CAPC (Companion Animal Parasite Council) parasite guideines. General guidelines for dogs, 2020; https://capcvet.Org/guidelines/general-guidelines/
3. Worm Control in dogs and cats. ESCCAP (European Scientific Councel Companion Animal Parasites) guideline 01 sixth edition-may, 2021
4. Miró G, Gálvez R, Montoya A, Delgado B, Drake J. Survey of spanish pet owners about endoparasite infection risk and deworming frequencies. Parasites vectors, 2020;13:101
5. American Heartworm Society. Current canine guidelines for the prevention, diagnosis, and management of heartworm (dirofilaria immitis) infection in dogs, 2020
6. ESDA (European Society of dirofilariosis and angiostrongylosis). Guidelines for clinical management of canine heartworm disease, 2017.
7. Estudio de mercado realizado por talenmo a 802 propietarios de mascotas españoles en 2021.

NexGard SPECTRA® Boehringer Ingelheim One Health parasit'Xpert

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U
Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
https://www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal
veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com

12DECVET21